

早瀬野ダム流域の水田水温と気温・日照時間の関係（2000年）

早期警戒情報においては、気温・日照時間・降水量が冷害危険度地帯別に過去7日間の移動平均で示されています。これらのデータと水田水温（午前9時測定）との関係を整理してみました。早瀬野ダム流域にもっとも近い監視地点アメダス弘前を使用しました。

2000年度は水温測定が日単位で測定されたため、過去7日間の移動平均を用いて関係を図示することにします。

1）日最高気温と水田水温の関係（図1参照）

- ・最高気温が25度を超えたのは7月1日で、幼穂形成期より早い時期にあたる。
- ・7月1日以前においては、最高気温が25度以下の時期では水田水温と最高気温との間には2，3度程度の差はあるが、両者はほぼ同値で推移した。
- ・最高気温が25度を超えると、水田水温は最高気温よりも低く経過した。




図1 アメダス弘前の最高気温と水田水温（午前9時）の推移
2000年度
過去7日間の移動平均

2）日最低気温と水田水温の関係（図2参照）

- ・最低気温が17度を超えたのは7月1日で、幼穂形成期より早い時期にあたる。
- ・水田水温は全期間を通して最低気温より高く、5，6月の生育初期においてその差が大きい傾向がみられた。

- ・ 6 月上中旬に最低気温が 12 度程度で経過したが、水田水温は 18 , 9 度であった。




図 2 アメダス弘前の最低気温と水田水温 (午前 9 時) の推移
2000 年度
過去 7 日間の移動平均

3) 日平均気温と水田水温の関係 (図 3 参照)

- ・ 平均気温が 20 度を越えたのは 6 月 30 日で、幼穂形成期より早い時期にあたる。
- ・ 6 月 30 日以降については、平均気温と水田水温は 2 , 3 度程度の違いはあるが、同じような値で推移した。
- ・ 6 月 30 日以前においては、水田水温は平均気温よりも常に高く維持された。




図3 アメダス弘前の平均気温と水田水温（午前9時）の推移
2000年度
過去7日間の移動平均